

Ordnen Sie die Leitsymptome dem entsprechenden Krankheitsbild zu:

① Ordne die Leitsymptome dem richtigen Krankheitsbild zu!

- | | | | |
|---|----|-----------------------|--------------------|
| intrahepatischer Ikterus | 1 | <input type="radio"/> | Peritonitis |
| Druck- und Entlastungsschmerz am Mc. Burney Point | 2 | <input type="radio"/> | Appendizitis |
| Sodbrennen | 3 | <input type="radio"/> | Magenbluten |
| bis zu 30 Stuhlentleerungen pro Tag | 4 | <input type="radio"/> | Refluxösophagitis |
| fehlende Darmaktivität | 5 | <input type="radio"/> | Morbus Biermer |
| brennender Defäkationsschmerz | 6 | <input type="radio"/> | Hämorrhoidalblutur |
| akuter linksseitige Oberbauchschmerzen | 7 | <input type="radio"/> | Analfissur |
| perniziöse Anämie | 8 | <input type="radio"/> | Gastroenteritis |
| Magen-Darm-Atonie | 9 | <input type="radio"/> | Typhus |
| brettharter Bauch | 10 | <input type="radio"/> | Colitis ulcerosa |
| hellrote Blutauflagerung auf Stuhl | 11 | <input type="radio"/> | Ileus |
| Gallenkolik | 12 | <input type="radio"/> | Hepatitis |
| Kaffeesatz artiges Erbrechen | 13 | <input type="radio"/> | Peritonitis |
| Brechdurchfall | 14 | <input type="radio"/> | Cholelithiasis |
| Erbsbreiartiger Stuhl | 15 | <input type="radio"/> | Miserere |